

allylständigem Wasserstoff des Olefins unter Bildung von Alkyl- (2) und Alkenylderivaten (3), b) Dimerisierung, c) gemischte Kupplung mit R<sup>+</sup> und d) Oxidation zu Kationen (4), die entweder solvolytiert werden oder -- bei 1,3-Dicarbonylverbindungen -- intramolekular zu Tetra- (5) oder Di-hydrofuranderivaten (6) cyclisieren. Mit Natriumazid gewinnt man über Weg a), b) und c) Mono- sowie 1,4- und 1,2-Diazide.

Führt man die Elektrolyse an Graphit- anstelle von Platin-anoden durch, so werden diese Additionen fast völlig unterdrückt, dafür bilden sich die Dimeren der Olefine<sup>[2]</sup>. Diese oxidative Dimerisierung von Olefinen erlaubt es, aus Olefinen einstufig 1,4-Dimethoxybutan- oder Butadienderivate herzustellen und Aldehyde oder Ketone über die Enoläther zu 1,4-Dicarbonylverbindungen zu kuppeln. Als Reaktionsweg nehmen wir die Oxidation des Olefins zu einem Radikalkation an, woraus durch Dimerisierung und S<sub>N</sub>1- bzw. E<sub>1</sub>-Reaktion 1,4-Dimethoxybutan- bzw. Butadienderivate entstehen.

[\*] Dr. H. Schäfer  
Organisch-Chemisches Institut der Universität  
34 Göttingen, Windausweg 2

[1] H. Schäfer u. A. AlAzrak, Angew. Chem. 80, 485 (1968); Angew. Chem. internat. Edit. 7, 474 (1968); H. Schäfer, Chemie Ing.-Techn. 41, 179 (1969).

[2] H. Schäfer u. E. Steckhan, Angew. Chem. 81, 532 (1969); Angew. Chem. internat. Edit. 8, 518 (1969).

### Reaktionen elektrophiler Agentien mit Phosphoniumsalzen ohne Hilfsbase

Von G. P. Schiemenz (Vortr.) und J. Becker [\*]

Phosphoniumsalze sind CH-acide Verbindungen. Die Kationen verlieren unter dem Einfluß von Basen ein Proton in  $\alpha$ -Stellung zum Phosphor; die so gebildeten Carbanionen reagieren mit vielen elektrophilen Agentien. Zur Überführung in die Carbanionen wurde bisher durchweg eine Hilfsbase zugesetzt. Diese sollte eigentlich überflüssig sein: Das Phosphonium-Kation hat zwangsläufig ein Anion bei sich, das unter geeigneten Bedingungen die Funktion der Base übernehmen können sollte, vor allem das in aprotischen, polaren Lösungsmitteln stark nucleophile Fluorid-Ion. Phosphoniumsalze wären demnach CH-acide Verbindungen und Basen zugleich.

Phosphoniumfluoride wurden in methanolischer Lösung aus den Bromiden oder Chloriden an einem fluoridbeladenen Ionenaustauscher hergestellt. Bei relativ wenig aciden Kationen ließen sich die kristallinen Fluoride isolieren; sie haben die für Phosphoniumsalze typischen Eigenschaften: Leitfähigkeits- und Molekulargewichtsbestimmungen zeigten, daß sie in polaren Solventien weitgehend dissoziieren, in Chloroform dagegen zu Ionenpaaren und höheren Aggregaten assoziieren. NMR-spektroskopisch schließen sie sich in CDCl<sub>3</sub> überraschend mehr den Jodiden als den Chloriden an, vielleicht wegen der Solvation des Anions. Die Signale der  $\alpha$ -Protonen erschienen als Dublett, d.h. eine Deprotonierung war so noch nicht festzustellen. In Acetonitril reagierten sie aber mit *p*-Nitrobenzaldehyd im Sinne einer Wittig-Reaktion in guten Ausbeuten zu den Olefinen.

Die Reaktion gelingt ebenso bei stärker aciden Phosphoniumsalzen, jedoch tritt die Deprotonierung zum Ylid bereits so leicht ein, daß die Fluoride nicht mehr isoliert werden können: Schon beim Eindunsten der methanolischen Lösung entsteht oft vollständig das Ylid, z.B. beim Triphenyl-*p*-nitrobenzylphosphoniumfluorid, dessen blaßgelbe methanolische Lösung monatelang stabil ist, erkennbar an der tiefroten Farbe. Da die Ylide hier nicht im basischen Medium gebildet werden, sind sie lange Zeit stabil; durch Luftfeuchtigkeit werden die Phosphoniumfluoride zurückgebildet. Die Sonderrolle des Fluorid-Ions zeigt sich im NMR-Spektrum von Acetyltriphenyl-phosphoniumsalzen in Acetonitril: Das Bromid hat für die  $-\text{CH}_2$ -Protonen ein Dublett; im Fluorid ist die <sup>31</sup>P-<sup>1</sup>H-Kopplung durch Depro-

tonierung-Protonierung-Gleichgewichte zusammengebrochen. Das besonders acide Cyanmethyl-triphenylphosphonium-Kation geht sogar schon als Bromid Wittig-Reaktionen ein.

Die Carbonyl-Olefinition versagt gelegentlich, wenn einer der Reaktionspartner gegen die zugesetzte Base empfindlich ist; z.B. können Aldehyde bevorzugt die Cannizzaro-Reaktion eingehen. Die neue Variante, bei der nicht im basischen Medium gearbeitet wird, verspricht hier Abhilfe. Zudem vermindern sich die benötigten Zutaten um die Hilfsbase: Eingesetzt werden nur noch Stoffe, von denen sich Gruppen in den gewünschten Produkten wiederfinden.

[\*] Doz. Dr. G. P. Schiemenz und Dipl.-Chem. J. Becker  
Institut für Organische Chemie der Universität  
23 Kiel, Olshausenstraße 40-60

### Der Mechanismus der Anionkatalyse des Nitramidzerfalls unter neuen Gesichtspunkten der Säure-Base-Katalyse

Von Hermann Schmid [\*]

Die Aufklärung des Ablaufs der allgemeinen Säure-Base-Katalyse bei der Mutarotation der  $\alpha$ -Glucose in wäßriger Lösung<sup>[1]</sup> führt auch zu neuen Gesichtspunkten hinsichtlich des Ablaufs der allgemeinen Basekatalyse beim Zerfall von Nitramid (H<sub>2</sub>N-NO<sub>2</sub>) in wäßriger Lösung. Die Entropieänderung  $\Delta S_2$  bei der Reaktion des hydratisierten Anions A<sup>-</sup>...H<sub>2</sub>O mit dem hydratisierten Oxonium H<sub>2</sub>O...H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> zur hydratisierten Säure AH...OH<sub>2</sub> ist aus den Katalysekoefizienten des Anions (k<sub>A</sub>) und des Wassers (k<sub>w</sub>) bei der Säure-Base-Katalyse der Glucosemutarotation nach<sup>[1]</sup> berechenbar:

$$\Delta S_2 = R \ln (k_A^-/k_w)$$

Ebenso läßt sich die Entropieänderung  $\Delta S_1$  bei der Öffnung der Wasserstoffbrücke AH...OH<sub>2</sub> aus den Katalysekoefizienten der Säure (k<sub>HA</sub>) und des Wassers (k<sub>w</sub>) bei der Glucosemutarotation berechnen:

$$\Delta S_1 = R \ln (k_{HA}/k_w)$$


Bei der allgemeinen Basenkatalyse des Nitramidzerfalls durch Anionen wie Formiat, Acetat, Propionat, Benzoat, primäres Phosphat sowie Hydroxid entspricht hingegen die Entropieänderung

$$\Delta S = R \ln (k_A^-/k_w)$$

der Entropieänderung bei der Reaktion von A<sup>-</sup>...H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O...H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> zur nicht hydratisierten Säure AH.

Diese Gleichung wird in der Weise interpretiert, daß der Anionreaktion -- analog der Glucosemutarotation -- der Übergang eines Protons von Nitramid (und/oder von seinem Tautomeren) zum Wassermolekül des hydratisierten Anions A<sup>-</sup>...H<sub>2</sub>O vorausgeht. Das dabei gebildete H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> reagiert mit A<sup>-</sup> wegen der unmittelbaren Nähe ohne weitere Aktivierungsenthalpie und nur mit der Entropieänderung  $\Delta S$ . Zum Unterschied zur allgemeinen Säure-Base-Katalyse der Glucosemutarotation führt diese Reaktion nicht zu AH...OH<sub>2</sub>, sondern nur zu AH.

Aus den OH<sup>-</sup>-Katalysen beider Reaktionen ist daher die Entropieänderung der Lösung der Wasserstoffbrücken



zu berechnen. Dieser Entropiewert stimmt mit dem von Walrafen aus dem Ramanspektrum des Wassers ermittelten Entropiewert überein. Anstelle der Brønstedtschen Beziehung tritt die lineare Beziehung von  $\Delta S_1$  und  $\Delta S_2$  zum Logarithmus der Basenkonstante K<sub>B</sub><sup>[1]</sup>. Im Vergleich zu

$$\Delta S_2 = \beta R \ln K_B$$