

2- α -Naphthyl-benzoxazol

von 0.251 g nach 436 Min. zurückerhalten 0.198 g = 78.89%
 » 0.256 » » 1024 » » 0.163 g = 63.68%

2-[*o*-Oxy-phenyl]-benzoxazol

von 0.250 g nach 960 Min. zurückerhalten 0.146 g = 58.40%
 » 0.501 » » 2450 » » 0.235 » = 46.88%

2-[*p*-Nitro-phenyl]-benzoxazol

von 0.200 g nach 1100 Min. zurückerhalten 0.195 g = 97.50%
 » 0.200 » « 2615 » » 0.148 » = 74.01%

Berichtigungen.

- Jahrg. 54, S. 3183, 82 mm v. o. lies: »Trinitrophenyl-methyl-nitramin« statt: »Trinitrophenyl-nitramin«.
 » 55, » 349, 116 » » » : »In verd. Mineralsäure löslich« statt: »in konz. . . .«.
 » » » 408, 90 » » » : »gelöste« statt: »ungelöste«.
 » » » 600, 86 » » » : »1920« statt: »1919«.
 » » » 616, 118 » » » : »2(C₆H₅)₂N« statt: »2(C₆H₅)₂N«.
 » » » 771, 12 » » » : »erhalten waren¹« statt: »erhalten¹«.
 » » » 797, 28 » » » ist »nächst« zu streichen.
-