

(Aus dem Institut für gerichtliche Medizin an der Militär-medizinischen Akademie zu Leningrad.)

Zur Frage der Altersbestimmung Minderjähriger.

Von

Priv.-Doz. Dr. W. A. Nadeshdin.

In der forensischen Praxis sind russische Gutachter oft in der Lage, objektiv das Alter legitimationsloser Kinder sowie auch minderjähriger vor Gericht gestellter Verbrecher feststellen zu müssen. Die letzteren haben solchenfalls die Neigung, ihr Alter zu verbergen, weil für sie darin ein Vorteil liegt, da nach dem in U.S.S.R. bestehenden Recht auf Minderjährige, die 14 Jahre nicht erreicht haben, nicht Strafen, sondern medizinisch-pädagogische Maßnahmen angewendet werden, für das Alter von 14—16 Jahren wird die Strafe um die Hälfte ermäßigt und wird auch nach dem Beschluß eigener gerichtlicher Kommissionen mitunter durch medizinisch-pädagogische Maßnahmen ersetzt, fürs Alter von 16—18 Jahren wird die Strafe um ein Drittel herabgesetzt.

Bekanntlich wird das Alter lebender Kinder und Minderjähriger zum Teil nach der Körperlänge und dem Brustumfange auf Grund folgender Tabelle festgestellt (*Quetelet*)

Alter	Männer		Frauen	
	Körperlänge m	Brustumfang m	Körperlänge m	Brustumfang m
Neugeborene . . .	0,50	0,30	0,49	0,29
1 Jahr	0,70	0,45	0,69	0,45
2 Jahre	0,79	0,47	0,78	0,46
3 „	0,86	—	0,85	—
4 „	0,93	—	0,91	—
5 „	0,99	0,52	0,97	0,51
6 „	1,05	—	1,10	—
7 „	1,10	0,55	1,15	0,53
8 „	1,16	—	1,18	—
9 „	1,25	—	1,19	—
10 „	1,27	0,60	1,25	0,57
11 „	1,33	0,62	1,30	0,58
12 „	1,38	0,64	1,35	0,59
13 „	1,44	0,66	1,40	0,61
14 „	1,49	0,68	1,45	0,62
15 „	1,53	0,70	1,50	0,64
16 „	1,55	0,72	1,53	0,66
17 „	1,59	0,76	1,55	0,67
18 „	1,66	0,78	1,58	0,68

Nach *Hoffmann* (Frankfurter Tabelle) betragen die Körperlängen der Knaben, in Klammern für Mädchen: 13—14 Jahre: 147 (143,4) cm; 14—15 Jahre: 152,3 (150,9) cm; 15—16 Jahre: 161,7 (156,5) cm; 16—17 Jahre: 165,0 (156,6) cm. Hinsichtlich des Durchbruchs der Milchzähne finden wir folgende Angaben (nach *Dietlein*): mittlere Schneidezähne 6—8 Monate, Abweichungen in Klammern nach der Zusammenstellung von *Thoinot* (4—10 Monate). Seitenschneidezähne 7—9 Monate (7—16); die ersten Backenzähne 12—14 (12—26 Monate); Eckzähne 15—20 (15—33 Monate); die zweiten Backzähne 20—30 (20—36 Monate). Zeitpunkt des Durchbruchs bleibender Zähne nach *Ungläube* (in Klammern nach *Lacassagne*): Der

1. große Backenzahn	{ oben 5—7 $\frac{1}{2}$ J. (7 J.) unten 5—8 J.	}	1. kleine Backenzahn	{ oben 9—12 $\frac{1}{2}$ J. (10 J.) unten 8 $\frac{1}{2}$ —13 J.
1. Schneidezahn	{ oben 5 $\frac{1}{2}$ —8 J. (8 J.) unten 6—9 J.	}	Eckzahn	{ oben 9—12 $\frac{1}{2}$ J. (12 J.) unten 10—14 J.
2. Schneidezahn	{ oben 6 $\frac{1}{2}$ —9 J. (9 J.) unten 7—10 J.	}	2. kleine Backenzahn	{ oben 9 $\frac{1}{2}$ —15 J. unten 9—14 J.
2. große Backenzahn	{ oben 10—14 J. (15 J.) unten 10 $\frac{1}{2}$ —14 $\frac{1}{2}$ J.			

Außerdem können wir nach unseren Beobachtungen vermerken, daß im Alter von 15 Jahren bei Knaben die Geschlechtsorgane wenig entwickelt und pigmentiert sind, die Areola mammae rosa gefärbt, keine Haare am Schamberge. Im Alter von 16 Jahren finden wir initiale oder vollkommen entwickelte Behaarung am Schamberge, die Geschlechtsorgane vergrößern und pigmentieren sich prägnant, auch die Braunfärbung der Areolae mammae wird intensiver, die Stimme wird tiefer. Bei Mädchen äußern sich die entsprechenden Reifungszeichen um 1—1 $\frac{1}{2}$ Jahre früher. Ungefähr im Alter von 18 Jahren sieht man wenigstens einen Weisheitszahn, oder sie schimmern unter dem Zahnfleisch durch (selten sind die Weisheitszähne schon im Alter von 17 Jahren vorhanden). In den Axillargruben bemerkt man beim männlichen Geschlecht einen anfänglichen (schwach wahrnehmbaren) Haarwuchs, beim weiblichen aber deutlich genug ausgeprägt (d. h. die Haare sind bis zu 1 cm lang). Bei Männern beginnt der Wachstum des Schnurrbarts größtenteils um 18 Jahre, des Kinnbarts später, aber diese letzten Anzeichen sind unbeständig. Das endgültige Gutachten über das Alter Minderjähriger gibt man nur auf Grund der Gesamtheit aller Angaben und zieht dabei in jedem einzelnen Fall auch alle individuellen Besonderheiten des Organismus in Betracht. Wir wollen hinzufügen, daß die Weisheitszähne bei Frauen in der Mehrzahl nach 20 Jahren vorliegen, bei Männern dagegen nach 22 Jahren. Es kommen natürlich auch Verspätungen vor.

Als wir alles Gesagte bei der Feststellung Minderjähriger anwandten, hatten wir (bei der Prüfung an bekannten Individuen) mit seltenen Ausnahmen Fehler in den Grenzen eines halben Jahres.