

Literatur

- Ehm, O. F.: Tauchen – noch sicherer! Leitfaden der Tauchmedizin für Sporttaucher, Berufstaucher u. Ärzte. Stuttgart: A. Müller 1974
- Glas, K.: Sporttauchen aus medizinischer Sicht. Fortschr. Med. 95, 1593 (1977)
- Moslener, Cl. D., Vogel, W.: Die medizinischen Grundlagen des Tauchens. Therap. Berichte (Bayer) 8–17, 1958
- Seemann, K.: Diagnose und Differentialdiagnose der Taucherkrankheiten. Münch. med. Wschr. 110, 1793–1797 (1968)
- Seemann, K., Wandel, A.: Der Taucherunfall mit Überdehnung der Lunge und Luftembolie. Münch. med. Wschr. 109, 2168–2175 (1967)
- Wünsche, O.: Intensiv-Behandlung bei Druckfallkrankheiten Hefte zur Unfallheilk. Heft 99, Springer: Berlin 1969

Eingegangen am 8. Dezember 1977

Erratum

„Häufigkeit positiver Diazepam-Befunde in Blutproben alkoholisierter Verkehrsteilnehmer“

H. P. Gelbke, H. J. Schlicht und Gg. Schmidt
Z. Rechtsmedizin 80, 319–328 (1978)

Auf Seite 323 lautet der vorletzte Absatz:

Diazepam-Konzentrationen zwischen 100 und 500 ng/ml: 14 Proben, entsprechend 30% der Diazepam enthaltenden Proben bzw. 0,7% des Gesamtkollektivs. Solche Diazepam-Konzentrationen finden sich in den ersten Stunden nach Einnahme einer therapeutischen Dosis. Bei gleichzeitig bestehender Alkoholisierung ist eine Verstärkung der Alkoholwirkung möglich.