Supplementary Data to Accompany:

A Mild and Efficient One-Step Synthesis of Quinolines

Brian R. McNaughton[§] and Benjamin L. Miller[‡]*

Spectral characterization for compound **9**:



9



^{13}CNMR (75 MHz, $CDCl_3$): 158.8, 154.6, 145.3, 144.3, 131.5, 129.7, 122.4, 120.6, 106.8, 60.9, 56.0, 33.1, 29.1, 23.1, 22.9.



^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 8.08 (s), 7.31 (s), 3.99 (s), 3.97 (s), 2.99 (t, J=6.4), 2.00 (m), 1.93 (m).

FT-IR (thin film, from $CDCl_3$):2931, 1613, 1479, 1410, 1374, 1248, 1152, 1040, 1004, 619 cm^{-1}

HRMS: M+H $C_{15}H_{17}ClNO_2$ calculated 278.0948; found 278.0947.

The remaining compounds exhibited characteristics identical to those previously reported in the literature:

Compound	Reference
2	Fakhfakh, M. A.; Franck, X.; Fournet, A.; Hocquemiller, R.; Figaderre, B. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 3847-3850
3	Russel, G. A.; Rafaratnam, R.; Wang, L.; Shi, B. Z.; Kim, B. H.; Yao, C. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, *115*, 10596-10604.
5	Jones, W. D.; Joseman, J. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 3563-3568.
6	Jacquigon, P.; Buu-Hoi, N. P.; Dufuir, M. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1966**, *9*, 2765-2767
7	Olson, R. J. *Tetrahedron Lett.* **1991**, *32*, 5235-5238
8	Curran, D. P.; Kuo, S. C. *J. Org. Chem.* **1984**, *49*, 2063-2065
10	Petrow, V. A. *J. Chem. Soc.* **1942**, 693-695
11	Katriztky, A. R.; Arend, M. *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 9989-9991
12	Nicolaou, K. C.; Safina, B. S.; Funke, C.; Zak, M. Zecri, F. J. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **2002**, *41*, 1937-1940.