

II. Georg. Joseph. Camel. *De Plantis Philippensibus Scandentibus*; Pars 2da. Ad Jacobum Petiver, S. R. S. nuper transmissa.

SECT. V. *De Scandentibus Folliculoso-Siliquosis.*

61. **A**POCYNUM LUZONIS 1, seu Antipolanum. *Indis* Balana. Fructum fert formæ & magnitudinis habitioris *Manga*, spithameum, viridem, copiosissime lactescentem, lacte candidissimo, spisso, nec viscoso. *Semen* compressum, magnitudine unguis digiti indicis, creberrimum, in oblongum glomum imbricatim congestum, flavescens, & unciâ longioribus, argenteis, & fericeis caudatum floccellis. Ex altissima dejectum arbore habui Fructum. *Florem* & *Folia* observare non licuit.

62. Apocynum LUZON. alterum. *Indis* *Tugtungajas*, i. e. *Viperinum*, eò quod eo Serpenes virides specialiter gaudeant; *Folia* gerit sibi opposita, ferme palmaria, similia folijs *Hingio*; *Fructum* orbicularem *Aurantio* parem latere uno fere digitum latâ cristâ alatum, ex viridi & albo variegatum, edulem cum tener, uniforem ubi cristatus, qui glomum continet *Seminis*, similis semini *Balana* super spongiosam matricem conglobati, in aurâs avolantis.

63. Apocynum LUZON. 3. *Maycatense*, *Viticulis* scandit creberrimis, vietis, geniculatis, lactescentibus. *Folia* promit *Hingio* similia, *Tugtungajas* majora, ex viridi pallentia, *Florem* frequentem, pentapetalum, radiatim in binum corymbum, seu umbellam congestum, graveolentem, flaventem. *Fructum* quadrangularem, tetraforem, viridem, spithameum, in macronem desinentem, continentem

mentem *Semen* squammatim congestum, lacusculum, simile *Semini Balana*, sed protensioribus, argenteis, & papposis filamentis, *Cometa* adinstar caudatum.

Fig. 64. Apocynum LUZON. 4. Maragondonense. *Indis* Dugtungajhas i. e. *Colubrinum*, *Hispan.* *Palo consuelda de la culebra*, alijs *Palo de la cabeza*. Minimè autem *Ligni Colubrini* nomen adeptum est, quod *Viperarum* succurrat moribus ut *Manungal*, sed quod *Serpentes* vulneratos hujus *Plantæ* folijs sibi mederi observatum fuerit, unde *Indi* edocti, & folijs & lignosorum sarmentorum, quæ fere brachialia, scobe, ad conglutinanda vulnera recentia prosperime utuntur. Hujus convolvuli lignosi, sarmenti materie albet, porosa est & spongiosa, levis & insipida. *Cortex* crassus, striatus, fissuris plurimis diductus, saporis subadstringentis, *Liber* interior tenax & corticosus. *Folia* sibi opposita; villosa, *Laurinis* latiora; *Radix* subdulcis: *Follicosi* fructus ex subrotundo ventre in teretem & ferme spithameum abeunt mucronem, *Semine* referti mediocri, ut reliquæ *Apocynorum* species.

Fig. 65. Apocynum LUZON. 5. *Taytayense*. *Indis* *Hingiguag*, i. e. *Hingi Corvinum*. Pro *Flore* dat candidas stellas, odoris *Jasmini*, in ramusculorum summitatibus exeuntes, quibus succedunt *Siliquæ* compressæ, scabie variegatæ, digito auriculari tenuiores, sed sæpius pedes duos longiores, pullæ, & semine pappo coronato repletæ: *Folia* pulchella, lætè virentia, sena communiter uno in ramusculo. Ipsa planta *Fruticosa* est, longis flexibilibus, & lacte glutinoso scatentibus virgultis scandens, & alijs supersterni gaudens.

66. Apocynum LUZON. 6. feu *Hingiguag Antipolanum*. *Folia* communiter 4, opacè virentia, palmum longa, sesquiunciam lata, uno gerit in ramusculo, ex quorum apicibus ex frequentibus ramulis, creberrimi *Flores* in *Siliquas* 12 aut 15 spithameis, senis aut pluribus orbicularibus ventribus gratiosè extuberantes, abeuntes: *Semen* parvum, appenso pappo ut quinti. Tota *Planta* uberrimè viscoso gaudet lacte.

67. Apo-

67. Apocynum LUZON. 7. seu *Piscatorium* fluvij *Manilensis* 1. *Gratiola* & scandens est Planta, *Folia* emittit bina ac bina, uno longiori inhaerentia pediculo, rarò palmum longa, communiter uncialia & sesquiuncialia, nigro virentia, tersa, quæ masticata primùm aduersi sunt saporis, mox fauces potenter acredine vellicant. Contusa cum alijs piscationi deserviunt medicæ. Ex medio connexionis foliorum, flagellum in summo trifidum, in foliola minima abiens procedit. Ad apices verò, uti & ad foliorum alas plures proveniunt *Flosculi*, qui ex 12 viridibus, crassis, teretibus seu cylindricis componuntur *foliolis*, quorum umbilicum, flavescens globulus, ex minimis compilatus staminibus, occupat; flosculi *Rosarum* mixtum *Cinamomi* suavissime respirant odorem. *Siliquæ* pusillæ ex tereti mucronatæ, unifores 12 aut pauciores in unum quasi congesti corymbum, *Semen* habentes parvum, oblongum. Provenit ubertim ad fluvii *Manilensis* ripas a Horto *D. Quintero villa S. Petri* usque. *Indi* *Itmoitmohan* vocant. Folijs contusis utiliter perfricant *Lepam Cascado*; succus illitus tumefacit.

Fig. 68. Apocynum LUZON. 8. seu *Malatense*. *Folia* Fig. habet sibi opposita, sesquiunciam longiora, ex rotundo oblonga, atrè virentia, in vietis & teretibus viticulis: *Florum* muscoforum, ramosi & spithamei racemi una cum cauliculis ex atro purpurei sunt. *Seminis Siliquæ* sesquiunciales, vix calamum scriptorium crassæ, virides, ex tereti mucronatæ. *Semen* parvum, latiusculum, niveam comatum cæsarie.

69. Apocynum LUZON. 9. *Viticulis* attollitur scandendo teretibus copiosè lactescentibus & helvâ lanugine pubescentibus. *Folium* est hederaceum, amplius palmo unò, longum sesquipalmum, sibi oppositum, per palmaria intervalla exiens, subsasperum: *Flos* parvus, pentapetalus, phæniceus, racematim coherens. *Fructus* bini, ac bini, fere sesquipal mares, calamum Anserinum crassi, unifores, & subhirsuti

hirsuti lobuli. *Semen* longiusculum, comatum floccellis ut reliquorum.

Fig. 70. Apocynum LUZON 10. *Indis* Dugtungafas ut 2 & 4. *Folia* promit per sesquipalmaria intervalla bijuga, unâ cum pediculo spithamea, palmo latiora, glabra, & crassiuscula. *Flos* congeritur ad foliorum genicula ter trinus, aut crebrior, parvus, viridis, stellatus, cui seminis succrescunt *Siliquæ* palmares, aut longiores, quasi ex binis calamo scriptorio crassis in unam coalescentes, seu in ipsa conjunctura carinulatæ & fissiles. *Semen* viride, longiusculum, compressum, argenteo caudatum pappo.

Fig. 71. Apocynum LUZON. 11. seu Silanense. *Cauliculis* scandit rotundis; *Folijs* luxuriat pulchris, sibi ex adverso provenientiibus, succosis crassioribus, nervis ceu altius prostantibus porcis concinnè exaratis, mucronatis, bipalmum longis, palmum latis. *Flos* ad foliorum exiens sinus, in longiori pediculo, duodenus, in corymbum dispositus, & majusculus, estque monopetalus ceu campana, flavescens infernè ad plicas purpurascens, cujus labia quinque fittiscunt hiatibus, in unum interius coactis, aut coalescentibus superne marginibus. *Fructum* non observavi, *Lanigerum* suppono.

Fig. 72. Apocynum LUZON. 12. Macatense. *Folia* communiter 4 in uno ramusculo, ex quorum apice *Flores* 5 aut 7. albi, stellati, mediocres, ad medium ut *Flores Borriginis* nigri staminibus umbilicati.

Fig. 73. Apocynum LUZON. 13. *Indis* *Tibalan* seu *Piscatorium* secundum. Scandens est Planta & lactescens, ut reliquæ. *Folia* mittit communiter 9 uno in ramusculo, & hæc fere spithamea, uncias 2 lata, in mucrone desinentia & nervis a medio in marginem rectè excurrentibus, & è regione oppositis exarata. Lenta, tractu contumacia, & lactescencia farmenta, piscationi deserviunt medicæ, cum folijs *septimi*, *Camæse*, & *Lactang fructu*, *Banulad*, *Burao*, *Tigao*, *Table* & *Culifao*, &c. *Tibalan* vel *Tabal* lac venenatorum animalium moribus medetur.

74. Apocynum LUZON. 14. Indis *Hingi, Hingib* & Fig. *Hingio*. Est unum ex magis usualibus *Ligustris*, cujus lenta, vieta & fractu resistentia sarmenta ad quævis occurrentia liganda deserviunt. Volubilis est Planta, scandens, lactescens, magna, folio sibi opposito, sesquipalmari, palmaris latitudinis, simili *Asclepiadis* folio. Pro *Fructu* siliquæ lanigeræ.

75. Apocynum LUZON. 15. Seu *Ligustrum Indorum* è celebrioribus 2, est *Bagungbung*, Calvigensibus *Bacungbacung*, alijs *Hacnaiag*: Hujus *Sarmenta* precipuè expetuntur & adhibentur ad anfractuosas, & labyrinthæas sepes, ex *Cannis* paratas, deligandas, quoniam submarina quasi perennant, quas per maris littoralia longius excurrentes disponent ad *Pisces* fallendos. *Lac* internè exhibitum prægnantibus Abortum causat. *Ligustris* adnumera & *Camagfa, Togtalag, & Sagacag*.

76. *Tubre, Tugle*, vel *Tugli* aut *Table*, alijs *Cassli* Boholais scilicet, Tanaguanensibus *Topoc*. Ni fallor species est *Apocyni*, pro *Fructu* etenim mittit *Siliquas*, semine sericè lanugine impletas. *Volubilis* est lactescens, piscationi deserviens medicæ, suâ acrimoniâ molestat ut *Radix* *Camæfæ*, *Euphorbij* scilicet modo: *Lac* Oculis inspersum excæcat. *Bysaiarum* Indi *Sarmenta*, quæ fere sunt brachialia, suo adjiciunt oleo *Polycresto, Haplas*.

77. *Tubre* vel *Tugle* altera. *Folia* fert composita, com-Fig. muniter ex alijs 7, alternè provenientia: Particularia verò conjugatim, claudente septimo seriem, sunt autem sesquiunciam lata, palmum, sesquipalmum, & amplius longa.

78. *Tugituguiar* deobstruens est, & insignis vulneraria.

79. Apocynum LUZON. 17. Seu *Arboribus* tantum in-Fig. nascens 1. Indis *Capalcapal*. *Visci* modo *Cannis*, & Arboribus vetustioribus, aut putridis innasci solet. *Folia* com-muniter habet palmaria, digitum lata, obtusa, crassa ut *Sempervivum*, & his crassiora, lævia, & copiosè lactescencia, ex opposito exeuntia, in teretibus viticulis, imo nonnunquam in plantâ luxuriante vitiosè folia palmum unum, aut sesquipalmum lata, & spithamâ magis, aut minus longa. *Flosculus* binus ac binus exit ad foliorum angulos, pusillus,

& candidus. *Semen* parvum plumosâ casarie ornatum, in trigonis & folliculosis filiquis.

80. Apocynum LUZON. 18. seu *Arboribus* innascens alterum. s. *Antipolanum*. *Folia* exerit unâ cum pediculo spithamea, uncias trinas lata, crassiuscula, 4 fere uno in ramulo, lactescentia. Planta tota lactescit, nec scandit ut reliquæ *Apocyni* species, sed quasi arboribus inserta, in aliquot abit ramos, quorum apices in florigeram desinunt umbellam ex 11 pluribus aut paucioribus flosculis constantem, qui formæ florum *Borraginis* sunt, candidæ scilicet & pentapetalæ stellulæ, pallido limitatæ auro, uti & hamatâ umbicatæ coronâ. *Fructum* non vidi.

Fig. 81. Apocynum LUZON. 19. seu *Arboribus* innascens 3. Variè serpendo per arborum caudices, *radices* iisdem insertas agit sat crassas, & lignosas. *Folia* formæ foliorum *Phyllidis*, crassa, exsucca, tersa, nervis carentia, excepto medium secante. *Flos* ex tubûlo pentapetalus, coloris cinnabarinî, in gratiosam congestus umbellam, trinus semper ex uno pendet calyculo, & crocatis staminibus repletur.

Fig. 83. Apocynum LUZON. 20. *Ligustri* loco deservit *Indis*. *Folium* subrotundum, hederaceum, succosum, suave, conjugatum, splendens. *Flos* frequens in umbellâ, virens, pentapetalus, rotundifolius, inodorus. *Sarmenta* tenacissima & lenta.

## Seçt. VI. Scandentes *Baccifera* folio *bijugo*.

Fig 83. *Periploca* 1. legitima & usualis. *Candotay* vel *Candotan Indis*. Yerba del pedo & Yerba de la mierda *Hispanis*. Rependo & scandendo quæque vicina amplectitur, quibus sese involvendo arctissimè innectitur. *Folia* habet *Asclepiadis*, e regione opposita, palmaria, non lactescunt. *Flores*, in 4 e foliorum geniculis prodeuntibus, semper trinè ramosis & longioribus pediculis; creberrimi, gratiosissimi, ex niveo purpurascens, campanulati, c. oris cre-natis, racematim congeruntur, quibus *Fructus* orbiculares, primùm virides, maturi rubentes, coronati, *Piso* compares succ-

succedunt, *semine* referti. *Folia* sterces foetidissimum olent, hinc *Stercorariam* vocant. Decoctum laudatur in *Urs* Urinæ retentione, Vertigine, Febribus, & ad casum ex alto, ad dissolvendos scilicet sanguinis concreti grumos, potum: Alij in enemate ad flatus discutiendos commendant. Alij in Urinæ retentione exinde balnea parant vaporosa, magma pubi imponendo. *Wilhelmus ten Rhyne* Folia Stercoriaria & *Foelo do Pedo* vocat, & ad Lepram commendat.

84. *Periploca* seu *Candotay* altera. *Folij* gaudet subrotundis, bijugis, palmaribus: *Flores* albi, stellati, in ramosa, seu semper in binos subdivisa ramulos, quasi umbella. *Fructus* est bacca, mucronata, *Piso* suppar, 5 folio caliculo.

85. *Periploca* s. *Candotay* 3. *Lianensis*. *Volvulus* est lactescens, folij sociati, angusti, sesquipalmaris, unciam lati, crassiusculi, & subhirsuti. *Viticula* compressa sunt, striata, vieta, subhirsuta. *Ufus* foliorum ad flatus pellendos.

86. *Periploca* s. *Candotay* 4. Similis est 3, sed folio hederaceo, palmum lato, & sesquipalmum longo, ex adverso appenso. *Radice* exigua, glumosa, s. grumosa, inæquali, & verrucosa, ut *Radix Scrophularia*.

87. *Coliyat*. *Volvulus* est maximus, *Prunifer*; *Folia* ferens, sibi opposita, spithamea, ferme sesquipalmum lata. *Fructus* promit copiosissimum, in maximis racemis, binum ac binum ab uno pediculo hærentem, magnitudinis ovi *Columbini*, aut majorem, ex flavo rubentem, carnosum, continentem nucleum formæ & magnitudinis glandis *Quercinae*, edulem, saporis *Castaneæ*, si igne coctus fuerit. Abundat in montibus *Antipolo* & *Paynam*.

88. *Smilax* LUZON. asper major, *Indis* Malaitmo. *Convolvulus* est magnus, folio rigido, nervoso, & *Malabathri* folio majori, trinervio, & sociato. *Fructus* sunt acini, *Ceraso* majores, lutæi, carnosî, amari, & in horum congesti, continentes binos, compressos, corneos, amaricantes, & asperâ ac albâ cuticulâ interfectos arillos.

89. *Smilax LUZON*. asper alter. *Manambuc*, *Panam-boc*, & *Yspassin* Indis. *Volvulus* est cujus *Sarmenta* trium sunt unciarum in diametro communiter, verò ferme verrucosa sunt, & crassa, ut *Macabuhay*, & similiter senectas deponunt, & exeunt Serpentum modo, ut illius. *Folium* nonnisi probè masticatum, leviter morficat, hederaceum est, *Betele* folio fere simile, sed tenerum, & molle, alternè exiens, trinervium; *Fru-ctus* sunt oblongi, *Avellanâ* minores, virides, mox lutei, tandem corallini acini, in racemum coherentes, & bini, aut trini ex uno pediculo: Mucagine, & unico, duriusculo, aspero, cujus medulla amara est, *ossiculo* referti. Flos albus est, parvus, tripetalus in triungui calyce. *Radix* deforis flavescit, cortice est crasso, & carnosio, ut *Zarzaparilla*, & ut hæc longissimè prorepit, crassa digitum, recenter eruta, & degustata ex levi amaritudine dulcescit, mox acredine molestat.

### Seçt. VII. Scandentes *Baccifera* trifoliæ.

90. *Clematis trifolia* vulgaris. *Calitcalit*, *Gavilan* & *Panopol* Indis. *Folio* crenato, obscure virenti, & parte alterâ subhirsuto, & communiter trino alternè e viticulis prodeunte, vicinis superinfernitur, & irretitur. *Flores* quadrifolij sunt, & herbacei. Quibus *Baccæ* primam virides, mox nigrae, succo morello plenæ, trinæ, ac trinæ cohærendo in corymbum succedunt. *Vulneraria*, & consolidans est, cujus folijs contusis, & sub cinere coctis, succoque expresso, vulgus, & ad emollienda *Ulcera*, & ad mundificanda & consolidanda rupta, & fracta, extirpandas *Lichenes*, & detergendam *Scabiem* utitur.

Fig.

91. *Clematis incana*. *Calitcalit maybula* Indis. Similis est vulgari, sed ad tactum tota suavis, ob molliusculum pilum, quo tota planta incanescit.

92. *Clematis monstrosa*, seu *Calitcalit* maxima. *Folia* gerit heptaphylla, glabra, & lætè virentia, majora quam sine *Clematidis acetosa*: *Flagella sesquicubitalia*; *Sarmenta Viti Vinifera* similia, brachium crassa; *Acinos* in corymbo, ut *Clematis vulgaris*.

93. *Oxyclematis*



93. *Oxyclermatis trifolia*. *Calitcalit masuca*, *Aiyo* Indis. Fig. Similis est priori, sed *folijs* majoribus, quæ & pentaphylla evadunt, profundius incisus, copiosiori, & acetoso succo turgentibus, ad quorum nexus longiores protuberant *capreoli*, quibus fulcitur sese innectendo. *Flores* quasi in umbellâ, flavescentes, tetra- aut pentapetali, quorum umbilicum calyculus ventricosus occupat. *Flores* in acinos abeunt, ut prioris, sed majores. Planta vulneraria est & febrifuga.

94. *Clematis LUZON*. 3. seu Major, sive *Vitis sylvestris*. Fig. *Indis Bica* & *Malauva*. *Planta* est scandens, trifolia, in quibusdam *Viti Sylvestri vinifera* similis, pilosa. *Folia* subrotunde crenata, sesqui palmum & longa & lata. *Botros* fert Magnos, *acinos* habiliores, asperos, subdulces, nigros aut etiam incarnatos ut *Silanij* vidi, foetentes.

#### SECT. VIII. Scandentes *Bacciferae*, folio alterno.

95. *Vitis Sylvestris LUZON*. altera. *Bulacan* s. *Buracan limbabon*, i. e. folij rubri *Guiganensibus*. an *Altragena* *Theophrasti*? *Volubilis*, scandens, & lactescens est planta, inter saxa ad fluviorum Margines provenire gaudens. *Sarmentis* est viticis, rubris, quandoque dodrantem crassis, *Foliis* *Vitis* vix non similibus, infernè subhirsutis. Utuntur ex recife longiori sarmento, aquoso, & insipido lacte, ad ʒ4 pro dosi propinando, quod suavissimè & sine ullâ molestia alvum subducit. Alij nihilominus alvum potenter deturbare ferunt, unde in colicâ, & animalium venenatorum moribus commendant, imo & in paucâ quantitate exhibitum abortum causare, & foetum mortuum expellere affirmant. An *Bexucus Peruanus* purgans *Godofredi le Brun*? quem *C. Clusius* *Atragenæ Theophrasti* sarmenta esse suspicatur.

96. *Bulacan foliorum viridium*, ob vehementiam quâ operatur in usum non venit; hujus ni fallor erunt effectus, foetum pellere, & alia, quæ supra.

97. *Vitis LUZON*. sylv. 3. *Ottoniensis*, Spontanea est Fig. & *Corinthiæ æmula*. *Pampini* vix palmares, trilobati, *flosculi*.

*flosculi* herbacæ, pentapetali, *Uva* ut *Corinthiaca*, in parvis racemis quasi in umbellâ.

Fig. 98. Alanguilang *scandens*, seu Hinlalagac. *Volubus* est *fructus* Rosei, acido-dulcis, tantillum pilosi, racemo appensi. *Mariquina* exit.

Fig. 99. *Vitis Ulceraria*, Alexandri. *Planta* est scandens: *Folia* hederacea, trinervia, crenata, splendidantia, sequi-palmaria, quæ degustata quidam acidit sapiant, mox fauces morficando vehementer exasperant. *Flores* parvi, albi, tetrapetali. *Baccæ* Magnitudinis Piperis & majores, in acumen abientes, ex adverso foliorum racematim propendent. Magni æstimant hanc plantam *Indi*, qui foliis contusis emplastri modo in Ulceribus putridis, antiquis, manantibus, sordidis, schirrhosis, callosis, fistulosis & cancerosis utuntur, præcipuè verò in Ulceribus faucium in collutione. Abscessus præterea, & Apostemata emollit, & rumpit, ut *Alypaiong*.

Fig. 100. *Viticella*, Balagundugut *Indorum*. Perpusillus, elegans, & gratiosissimus est *Volubus*; folia incana, quinque-nervia, alterna, corda effingentia; *Flosculi* minimi, albidii, muscosi, quasi in corymbum coeunt; *Baccæ* lætè rubentes, qualia Sardois hærent *Corallia saxis*, pifo minores, foliorum congeriei imbricatim immixtæ, pulchellos concinnant racemulos.

Fig. 101. Malabanag. *Scandens* est *Planta*, habens *folia*, 5 nervia, alterna, similia *Banag*, i. e. *Pseudochinæ*, ex adverso foliorum umbellæ *Florum*, inodorum, ex viridi flavescantium, hexaphyllorum, quibus *Baccæ* rubræ, parvæ, insipidæ, lento glutine turgidæ, Piperi pares succedunt. *Semen* parvus est *Phaseolus*.

Fig. 102. *Coccus volubilis*, *Indis* Lobato, Libato, & Bredotali: *Hortensis* & duplex montanus, *Naicensis* & *Maisilanus*. *Hortensis* *Planta* est scandens, succosa, vesca, tenera, amans umbrosa & uda. *Viticuli* crassii, teretes. *Folia* carnosa, ampla, fere spherica, in mucronem vergentia, flavescantia, tersa, & nervis expertia, alternè appensa. In summitatibus ramusculorum e regione foliorum unciales, aut sesquiunciales

giales racemuli, sessilibus, coccineis, pisco paribus, succoque chermesino exuberantibus *baccis* onusti, saporis nullius manifesti. *Semen* orbiculare Coriandro minus. *Flosculi* calyculati, erubescētes. *Radix* coloris nativi, succosa, nodosa, verrucosa, & *scrophularia* modo multifariè inæqualis, & divaricata. Succum *Indi* ad caloris æstum in Febribus attemperandum propinant. Vescuntur folijs decoctis, & in acetarijs crudis. Ex *Baccis* syrupum paravi coloris coccinei, ad Julepos Febricitantium pulchro imbuendos colore perutilem.

103. *Coccus volubilis sylvestris*. Pariter edulis est; *Folia* tenera, succulenta ut *Portulacæ*, teresa, priori majora, ex atro virentia. *Folia* suppurationem adjuvant adimposita; Decoctum alvum emollet.

104. *Cubebæ Officinarum*. Plantam *Indi* Naple, Dalihupa & Buyonibun, i. e. *Betele-Corvinum*, vocant. Hæc non ut *Betele* seu *Itmo*, *Mala-Itmo*, *Littit* ac *Sabia* alijs inhærendo scandit, sed vicinis sese acclinando, ac superinfernendo luxuriat, estque Planta amans umbrosa, crebrè ramosa, ramis solidiusculis, geniculatis nec vietas, ut reliquæ *Piperis* species, folijs obscurè virentibus, parvis communiter, sesquiuncialibus, quinis fulcitis nervis, aromaticis. *Fructus* qui racematim propendet, maturus coloris est incarnati, *Semen* habens album, orbiculare, acriuscule, aromaticum. Hæ *Baccæ* cum *Clusij* descriptione collatæ, legitime sunt *Cubebæ Officinarum*. Racemuli sunt sesquipalmes.

105. *Piper nigrum*. *Hederæ* modo arboribus irrepēdo, & geniculis Sarmentorum (quæ brachio crassiora) radículas emittendo, & specialiter *Arbori Dapdas* (ob molliusculum & succosum corticem) innafei gaudet & vitiosè luxuriat. Crescit in *Leyte*, *Otton*, *Panay* & *Mindanao*. *Fructus* in racemis, acini maturi rubent. *Piper nigrum* sunt acini virides collecti: *Album* sunt acini maturi collecti, sed unius plantæ fructus.