

I. *De Araneis & Scarabæis Philippensis*. Ex MSS. R. P. Geo. Jos. Camelli. Communicavit Jacobus Petiver, S. R. S.

*De Araneis Crustaceis Philippensis*.

**A**raneos fila deducere non ab intrinseco, tanquam excremento, ut ait *Democritus* & *Plinius*; sed extrinsecus de suo corpore, veluti cortice, afferit cum *Aristotele Aldrovandus* & *Forerius*.

*a GAZ. Nat.* Verum Anno 1695. (*a*) Araneos *Crustaceos* nitidissime  
*Tab. 26.* nigro & flavo picturatos, formæ *Tribuli*, vel potius *Paguri*, in Horto domestico in *Acacia* & *Fagara* cœpi. Unde *Democriti*, *Plinij*, *Josephi Blancani* & aliorum sententia, Araneos ab intrinseco fila sua ducere vindicanda videtur.

*b GAZ. Nat.* Alios *testaceos* (*b*) sexangulares dein Anno inveni sub-  
*Tab. 26.* sequenti, flavo & nigro; alias (*c*) albo & nigro varia-

*fig. 6.* tos, & sex aculeis spinosos: *Alium* (*d*) item postea

*c GAZ. Nat.* flavo & nigro variegatum, majorem, & formæ Lunaris. *an*  
*Tab. 26.*

*fig. 8.* Hoitztocatl *Niremberg*: seu *Araneus spinosus*? morsu de-

*d GAZ. Nat.* mentans, superiore & media corporis portione niger,  
*Tab. 26.* cætera luteus, formæ aculeatæ & similis *Tribulo*. Aranei

*fig. 5.* crustacei ictui medetur *Tambalquisay*, *Camaqua* & *Pilipoc*.

Nidum vel Ovarium texit electe sericeum, flavum vel

etiam virentem, in qua ova reponit candida.

1. *Araneus Luzon.* crustaceus, cornu lunulato. *GAZ.*  
*NATUR.* *Tab. 26.* *Fig. 7.*

2. *Araneus Luzon.* testaceus, trilunatus. *GAZOPHYL.*  
*NAT.* *Tab. 26.* *fig. 6.*

3. *Araneus Luzon.* *Bovinus.* *GAZ.* *NATUR.* *Tab. 26.*  
*fig. 5.*

4. *Araneus*



4. *Araneus Luzon.* testaceus, angustus, trilunatus. GAZ. NAT. Tab. 26. fig. 8. De Araneis alijs *Luzonensisibus.*
5. *Araneus Banayau* 1. *Kamel.* Aran. *Luzon.* mortiferus Smaragdino-aureus. GAZ. NAT. Tab. 29. fig. 4. Hic ictu soporem & mortem causat Hominibus & Brutis: gaudet Syringæ seu Sambach Arabum convolutis in folijs habitare: hujus ictui medetur decoctum *Dauve* & Ignis. an *Araneus aureus*, *Lavalava* Nirembergij, stuporem & insaniam inducens?
6. *Araneus parvus brevipes*, coloris chermesini, mortiferus, *Banayau* 2 *Kamel.*
7. *Araneus gibbosus* *Luz.* subfuscus, gibbo oblongo, per totum dorsum protracto, elevato & flavo *Kamel.* GAZ. NATUR. Tab. 29. fig. 12. *Ova* recondit in orbicularibus, flavis & sericeis nidis, *candidula*.
8. *Araneus gibbosus alter.* Corpore est *Piso* suppari, dorso proprie in aitum gibbum elevato, de reliquo picturatus est aureo fulgente, argenteo relucente & nigro aterrimo.
9. *Araneus longipes* 1. *Kamel.* Ar. *Luz.* longipes domesticus. GAZ. NAT. Tab. 50. fig. 1. Corpore est Muscæ tenuiori, domesticus, retiarius, rete varium, quod præda adveniente totum concutit. Communiter Mas & Fæmina in eodem degunt. *Fæmina* habitior est, & una nocte *Ova* exclusit, quæ mane in *Piso* pari racemulo congesta ore pendentia gerebat; die 3 à capturâ pilosa aparuere, 4 magis pilosa, 5 frequentes aranei per vitrum dispersi sunt, remanente inani & candido ovario ab ore matris pendente.
10. *Araneus longipes alter* *Kamel.* *Araneus Luzon.* longipes, sem. Ricino æmulans. GAZ. NATUR. Tab. 50. fig. 4. Habitior est priore, ventre *Piso* pari splendido, & ut semen Ricini picturato, mucronato.
11. *Araneus longipes* *Luzon.* 3. Domesticus est, hirsutus & innocuus.
12. *Araneus*

12. *Araneus longipes Trojanus* sive 4. *Bagua & Gam-*  
*bagamba Indis.* *Tarantula Luzon.* *innocuus.* GAZ. NAT.  
 Tab. 50. fig. 2. & A. Corporis mole Avellanam æquat, seri-  
 ceum, albicans, folliculosum, globoso-subplanum ovarium  
 ad ventrem gerens, ex quo mille prodeunt Araneorum.  
 Cæterum fuscus, domesticus, innocuus, vescens Proscara-  
 bæis. an *Araneus* 10 *Hernandi* ?
13. *Araneus longipes* 5. *Gagamba Luzonensis*. Cor-  
 pore minor, quod cinereo & nigro picturatum est.
14. *Araneus longipes* 6. *Araneus Luzon.* telarius, ar-  
 genteo, flavo, & nigro transversim striatus. GAZ. NAT.  
 Tab. 50. fig. 3. Subdialis est. Ejus sericeum album &  
 planum ovarium, in quo ut puto 2000 ovorum alborum  
 latebant. vid. Tab. 50. fig. B.
15. *Araneus Luzon.* oblongus, lutescens, longipes, ven-  
 tre tenui, geniculo in caudam distincto. GAZ. NATUR,  
 Tab. 43. fig. 14.
16. *Araneus maximus*, fuscus, pilosus; *Damang Luzon.*  
*Corpo* crastitudinis est pollicaris. *Degit* locis humidis:  
 perniciousus ut *Vipera*. an *Species Tarantulæ* ?
17. *Araneus Luzon.* ex argenteo, flavo & fuscō pal-  
 chre mixto, pedibus nigris. GAZ. Nat. 29. fig. 6. *Araneus*  
 pulchrè picturatus: Caput, Pectus, corporis binæ striæ  
 laterales, & illa per medium excurrens, argenteo relucente  
 colore obducta: Binæ striæ inter argenteas excurrentes  
 fulcæ, 4 flavis transversim secantibus strijs cancellatæ:  
 pedes longi, nigri.
18. *Araneus Luzon.* torosus, pilosus, totus fuscus. GAZ.  
 NAT. Tab. 29. fig. 10.
19. *Araneus Luzon.* torosus, pilosus minor, dorso nigro  
 variegatus.
20. *Araneus rarus*, niger, splendens; forficulas habens  
 ipso ventre compares; nec primo intuitu facile dictu,  
 quisham venter, aut quæ sint forficulæ. GAZ. NATUR.  
 Tab. 54. fig. 3.

21. *Araneus venator Muscarum*, in parietum rimis  
degens, albo & griseo variegatus: Saltu Muscis insidians. 21  
*Hispanis Cayman de las Moscas.* GAZ. NAT. Tab. 54. 4.
22. *Cotocoto.* Araneus est Aquaticus. 22
23. *Laura vel Lavalava.* Araneus est Domesticus. 23  
De Scarabaeis Luzonensibus.
- Cantharis Luzon.* *Cetonia prasino-aurea*, luteo-albican-<sup>1</sup>  
tibus maculis variata, ad ventrem ejusdem coloris, sed <sup>GAZ. NAT.</sup>  
<sup>Tab. 26. f. 9.</sup> striatim picturata. GAZOPHYL. NAT. Tab. 26. fig. 9.
- Cantharis Luzon.* pulcherrima, vaginâ integrâ non 2  
fissâ, quinis aureo-cyaneis maculis ornatâ, ipsa havo-au-<sup>G. N. 37. 7.</sup>  
rea; venter medius superne smaragdino-aureus & tribus  
aureo-cyaneis maculis notatus ut vagina dorsi: Inferior  
venter aureis & aurêo-virentibus strijs transversim virga-  
tus est.
- Stockerus Luzon. viridis, scapulâ maculîq; purpureis.  
GAZ. NATUR. Tab. 37. fig. 7.
- Cantharis Luzon.* *minima*, magnitudinis est hujatis 3  
Cicindelæ, smaragdino-aurea, capite & pedibus cyaneis,  
collo luteo, corniculis plumatis. *Indis* Alibamban &  
Paranparan.
- Cantharis Catunduana* & *Bicolana major*, palmo lon- 4  
gior, auriluca, smaragdina. *Indis* Olaniban & Basan-  
goban.
- Cantharis oblonga communis*, nitidissime tota, aureo- 5  
viridis, *Camarinensem*. Diao, Giao, Laniban & Salibat <sup>G. N. 48. 5.</sup>  
*Indis.* GAZ. NAT. Tab. 48. fig. 5.
- Cantharis cæruleo-aurea*, elytris ad medium luteo-au- 7  
reis maculis notatis. GAZ. NAT. Tab. 49. 7. <sup>G. N. 49. 2.</sup>
- Cantharis merè viridis*, *Indis* Ticpaclong. GAZ. NAT.  
Tab. 41. fig. 2.
- Cantharis auriluca*, viridante & rubente striatim varia. 8  
*Cochinella Luzon.* major, è cupreo viridiique eleganter <sup>G. N. 41. 3.</sup>  
striata. GAZ. NAT. Tab. 41. fig. 3.
- Cantharis Luzonis* nona & maxima, perpolita, tota 9  
multò splendidior quintâ, colore aureo-smaragdino per-<sup>G. N. 28. 3.</sup>  
petuante

petuante. Differt a Quintâ, capite, quod longius; mustacis, qui curti & subplani; scapulari, quod longius angulosè protensum, & pedibus, quorum ultima articulatio spinosa, uropygio, quod coloris est cuprei. Oculi nigri sunt.

*Scarabæus pectinatus Luzon.* aureo-smaragdinus. GAZ. NAT. Tab. 28. fig. 3.

9 *Capricornus Luzonicus*, seu *Carabus*, sive *Cerambix*, facie G. N. 37. 6. *Tauri*. Antennis articulatim nodosis; coloris in fusco, cinereo-lutescente undulatus, capite valido, facie Tauri, duobus majoribus & aduncis dentibus instructus. GAZ. NAT. Tab. 37. fig. 6.

10 *Capricornus alter*, atratus est & striatus. GAZ. NAT. G. N. 37. 12. Tab. 37. fig. 12.

11 *Capricornus Luzon.* 3. Totus ex atro & pomi aurei co- G. N. 28. 5. lore picturatus est. GAZ. NAT. Tab. 28. fig. 5.

12 *Capricornus* seu *Cerambix Luzon.* maxima. GAZ. NAT. G. N. 47. 1. Tab. 47. fig. 1.

13 *Buceros Nasicornis* 1. *Luzon.* Hoang. GAZ. NAT. Tab. G. N. 49. 8. 49. fig. 8. & Kamel. in Append. Ray Hist. Plant. V. 3. p. 44.

14. *Buceros Nasicornis* alter *Bogang* *Luzon.* GAZ. NAT. G. N. 29. 2. Tab. 29. fig. 2 & Kamel in App. Ray. p. 44.

15. *Melolonthes* seu *Cantharis* merè viridis major. *Indis Salaguinto.* *Germanis* Gruner, *May-Koffer*, & S. Joannis Koffer.

16 *Melolonthes* seu *Cantharis* merè viridis minor. *Indis Ticipaalong*, Germ. Gold Koffer, id No. 7. G.N. 41. 2.

N. B. Inveniuntur & Flavæ, Rubeæ, Ceruleæ, & variè picturatæ.

17 *Scarabæus arboreus*, seu *Bruchus Majalis* sublustris, in G. N. 38. 11. fusco cinereis punctis notatus, Europæo compar & major.

*Indis* *Salibamban* & *Salagubat*, Germ. Mayen-Koffer & Baum-Koffer. GAZ. NAT. Tab. 38. fig. 11.

18 *Scarabæus arboreus* 2. luteo-fuscus, tenuissimè striatus. G. N. 38. 6. GAZ. NAT. Tab. 38. 6.

19 *Scarabæus arboreus* 3 subplanus, sublustris, luride èrugi- G. N. 38. 5. nose maculosus. G. N. Tab. 38. fig. 5.

- Scarabæus atratus*, elytris striatis, forcipulâ validâ <sup>20</sup>  
bifurcâtâ, quâ arbores atterebrat, donatus. G.N. Tab. 42. 3. G.N. 42. 3.
- Scarabæus mirabilis*, caput lato & denticulato scuto <sup>21</sup>  
contegente. Gaudens *Scilla*. GAZ. NAT. Tab. 42. fig. 2. G.N. 42. 2.
- Scarabæus pilularis* torosus, niger, *Luzonis minimus*. <sup>22</sup>  
Germ. Ross-Koffer. GAZ. NAT. Tab. 42. fig. 5. G.N. 42. 5.
- Scarabæus Luz.* *elasticus*, *vaginis striatis*. GAZ. NAT. <sup>23</sup>  
Tab. 27. fig. 10. G.N. 27. 10.
- Scarabæus saltator* *Luz.* Germ. Springer. *Indis* Dangdo.  
Hujas Europæo major est, sublustris, coloris terreo-fusci,  
non ater ut ille; ad Pectus habet solidum stimulum, quo  
supinè positus nititur in altum vibrari. Elytra striata,  
caput parvulum.
- Scarabæus Saltator*, seu ille parvus, oblongus, niger, qui <sup>24</sup>  
supinè positus e latere intenso in altum vibratur, in *Luz*-  
*zone* sordidè niger est & sesquiuncialis. Hisp. Batecavezzi.  
Germ. Springer & Schuester. *Indis* Baldoc bondoc.  
*Tagal* Dangdo.
- Scarabæus Saltator* alter parvulus Europæo minor est, <sup>25</sup>  
luteus, & ad extremum niger.
- Proscarabæus nocturnus domesticus Kameli.* <sup>26</sup>
- Blatta domestica* *Luzon.* nocturna. GAZ. NAT. Tab. G.N. 48. 9.  
48. fig. 9. *Cucca* & *Cuccaracha* Hispan. Schioabem Germ.  
*Lusit.* Barata. *Ipis* & *Bangcocang* *Indis.* hujus est Spe-  
cies *Gukiana*.
- Insectum est malè olens, elytris tenuibus, omnia depa-  
cens & arrodens. *Mas* coloris grisei, aliquibus nigris  
punctis variegatus. *Femina* tota coloris castanei, & mi-  
nor mare, ova excludens oblongo-compressa ad latus  
acuta. *Mas* & *Femina* depositâ senectâ candidi sunt &  
tenelli. Utuntur *Indi* cinere poto in Astmate, contusis  
cum Saccharo, & impositis in *Cancro* & *Panaritio* & ulce-  
ribus suppurandis. Afls No. 6 vel 8. exhibit *Pueri*  
*lumbricis* laborantibus, quos enecant.