

**XI. Observatio Defectus Lunæ habita (tubo optico
optima notæ, longo pedes Parisienses septem) Pa-
tavii VI. Id. Octob. 1726. ab eodem Viro Cla-
rissimo.**

Temp. Appar.

H. 1 11

- 16 16 44 Penumbra diluta.
 18 54 Penumbra densior.
 21 19 Umbra ad Lunæ limbum.
 31 35 Attingit Mare Humororum.
 35 47 Attingit Grimaldum.
 38 34 Distat a Tychone diametro Tychonis
 ipsius, & Grimaldum tegit tertia ejus-
 dem Grimaldi parte.
 50 40 Fere attingit Pitatum.
 17 3 41 Lansbergium tegit.
 7 45 Attingit Reinoldum.
 15 56 Attingit Fracastorium, & Galileum.
 25 53 Attingit Mare Fœcunditatis.
 39 6 Umbra proxima est ad Reinoldum, te-
 gitque partem tertiam Maris Fœcunditatis.
 46 Grimaldus emergit.
 54 53 Grimaldus jam distabat ab umbra dia-
 metro majore sui integra.
 18 5 44 Gassendus totus modo extra umbram,
 Mare Fœcunditatis dimidia circiter
 parte detectum, inter dehiscentes nubes
 videbantur.
 Quæ nubes ad Finitorem deinde coactæ
 occiduam Cæli partem penitus obumbra-
 vere; neque Luna posterus apparuit.