

1. A Catalogue of the FIFTY PLANTS from Chelsea Garden, presented to the ROYAL SOCIETY by the Company of Apothecaries, for the Year 1737. pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Bart. Med. Reg. & Soc. Reg. Praef. by Isaac Rand, Apothecary, F. R. S. Hort. Chel. Praef. ac Praelec. Botan.

751. **A**CETOSA Ægyptia; roseo seminis involucro; folio lacero; *Lippi. D. Shaw Phyt. Afr. Spec. No. 5.*

752. Adianthus nigrum; radice prælonga, arbores annosas perreptante. *Grif. Virid. Lusitan.*

Filicula Lusitanica; Polypodii radice. T. Inst.

541.

753. Admirabilis Peruviana; flore rubro. *Clus. rar. Plant. Hist. Lib. V. p. 89. Sloan. Cat. Jam. 91.*

754. Androsænum maximum frutescens. C. B.

280.

755. Aralia Canadensis. *T. Inst. 300.*
Panaces κάπτιον sive racemosa, Canadensis.

Cornut. 74.

756. Astrantia major; corona floris candida. *T. Inst. 314.*

757. Astrantia major; corona floris purpurascente. *T. Inst. 314.*

758. Betonica Orientalis; folio angustissimo, & longissimo; spica florum crassiori. *T. Cor. 13.*

A

759. Bi-



[2]

759. *Bidens Americana triphylla*; foliis angustis, acutis.

Chrysanthemum Virginianum, folio acutiore lœvi trifoliato; seu *Anagyridis folio*. *H. Ox. III.* p. 21.

760. *Campanula pentagonia*, perfoliata. *Moris. H. Ox. II.* 457.

761. *Cassine vera* perquam similis, *Arbuscula Phillyreae* foliis antagonistis. Ex Provincia Caroliniensi. *Pluk. Mantiss. p. 40.* *Phytogr. Tab. 381. Fig. 3.*

762. *Cepa fissilis*. *Matthiol. 555.*

763. *Cepa Ascalonia*. *Matthiol. 556.*

764. *Chenopodium Ambrosioides Mexicanum fruticosum*.

765. *Christophoriana Americana procerior & longius spicata*. *Dillen. H. Elt. Tab. 67.*

766. *Commelina angustifolia procumbens*.

767. *Dalea*. *Dni. Millar inventoris.*

768. *Dentaria bulbifera*. *Lob. Icon. 687.*

769. *Digitalis minima*, *Gratiola dicta*. *H. Ox. Part. II.* 479.

Gratiola Centauroides. *C. B. 279.*

770. *Elichrysum*; angustissimo folio. *T. Inst. 452.*

Stæchas citrina tenuifolia altera, sive *Italica*.

J. B. III. 155.

771. *Epimedium*. *C. B. 323.* *Dod. 599.*

772. *Eruca sylvestris*. *Ger.*

Eruca sylvestris tenuifolia perennis; flore luteo.

J. B. II. 861.

773. *Eruca*; *Bellidis folio*. *Mor. H. Ox. P. II.*

231.

774. *Eupatorium cannabinum*. *C. B. 320.*

Eupatorium Avicennæ Officin.

775. Eu-

775. *Eupatorium*; folio oblongo rugoso; caule purpurascente. *T. Inst.* 456.

776. *Fagopyrum erectum*; seminibus ad angulos dentatis, spicatim nascentibus. *Ex Russia*.

777. *Ficus Orientalis*; foliis in lacinias angustas profunde incisis.

The large white Turkey Fig.

778. *Fumaria officinarum* & *Dioscoridis*. *C. B.* 143.

779. *Fumaria bulbosa*; radice cava, major. *C. B.*

143.

780. *Fumaria lutea*. *C. B.* 143.

781. *Fumaria semper virens* & *florens*; flore albo.

Boerh. Ind. I. 130.

782. *Galeopsis patula* segetum; flore purpureo-scente. *T. Inst.* 185.

Sideritis arvensis rubra. Park.

783. *Hernandia*; amplo *Hederæ* folio, umbilicato. *Plum. Nov. Gen.* 6.

Nux vesicaria oleosa, foliis umbilicatis, ex *Insula Barbadensi*. *Pluk. Phyt.* 208. Fig. 1.

784. *Hypericum Androsænum* dictum. *J. B.* III.

382.

Androsænum alterum hirsutum. *Colum. Ec.*

75.

785. *Lycopersicon Galeni*. *Ang.* 217.

786. *Petiveria*, *Solani* foliis; loculis spinosis.

Plum. Nov. Gen. 50.

Verbenæ aut Scorodonie affinis anomala, flore albido; calyce aspero; *Allii* odore. *Sloan. Cat. Jam.*

64. *Guinea Hen weed*. *Hist. I.* 172.

787. *Pyrethrum Officinarum*.

Pyrethrum flore Bellidis. *C. B.* 148.

Chamæmelum specioso flore; radice longa servida. D. Shaw. Phyt. Afric. Spec. №. 138.

788. *Pyrethrum frutescens Canariense.*

Leucanthemum Canariense; foliis Chrysanthemi; Pyrethri sapore. T. Inst. 666.

789. *Rapuntium Americanum, flore dilute cœruleo.* Ac. Reg. Par.

790. *Rapuntium Virginianum; foliis oblongis; floribus parvis cœruleis, spica longissima laxa.*

791. *Reseda alba.* J. B. III. 467.

792. *Reseda crispa Gallica.* Bocc. Rar. 76.

793. *Solanum fruticosum bacciferum.* C. B. 166.

794. *Thlaspidium fruticosum; Leucoii folio, semper florens.* T. Inst. 214.

Thlaspi fruticosum Persicum; foliis Keiri, flore odorato. Zanon. 196.

795. *Trichomanes sive Polytrichum Officinarum.* C. B. 356.

796. *Turritis vulgaris ramosa.* T. Inst. 224.

Pilosella filiquata Thalii. Tab. vii.

797. *Turritis Leucoii folio.* T. Inst. 224.

798. *Turritis Leucoii folio; floribus amplioribus.*

799. *Ulmaria.* Clus. Hist. CXCVIII.

Barba Capræ floribus compactis. C. B. 164.

800. *Ulmaria; floribus in longas spicas congestis.* Boerb. Ind. Alt. 295.

Barba Capræ floribus oblongis. C. B. 163.