

VII. Bildung der Vena cava inferior durch Zusammenfluss von drei Stämmen.

Beobachtet im Februar 1869 an der Leiche eines Mannes.

Die Vena cava inferior hatte sich aus drei Stämmen, zwei seitlichen und einem mittleren gebildet. Die seitlichen Stämme waren die Iliaca externa dextra und sinistra; der mittlere, 6 Lin. lange und 6 weite Stamm war eine Iliaca interna communis, zu dem sich die Iliaca interna dextra und sinistra der Norm vereinigt hatten.

VIII. Bildung der Vena cava inferior durch Zusammenfluss von 3 Stämmen, und Bildung von Inseln zwischen der Vena iliaca externa und interna der linken Seite.

Beobachtet in der Leiche eines Weibes im October 1869.

Die drei Stämme, aus welchen sich die Vena cava inferior gebildet hatte, waren: die Iliaca communis dextra, die I. externa und die I. interna der linken Seite.

2 Zoll 7 Lin. vom Anfange der Cava inferior ging ein 2—3 Lin.⁺ kurzer Ast, und 1 Zoll vom Anfange derselben ein zweiter, kurzer und 4 Lin. weiter Ast der Iliaca externa sinistra zur Iliaca interna sinistra. Dadurch war eine der Cava inferior näher gelagerte, 1 Zoll lange, und eine davon entferntere und 1 Zoll 3 Lin. lange Insel entstanden.

IX. Ungewöhnliche Lage des Nervus facialis in der Parotis zu den Gefäßen.

In zwei Fällen, 1865 und 1870, sah ich den Nervus facialis in der Parotis zwischen der Vena facialis posterior und Arteria temporalis superficialis seinen Verlauf nehmen, anstatt auswärts von der genannten Vene, diese kreuzend, die Parotis zu durchbohren.

X. Ungewöhnliche Anordnung der Hautnerven am Handrücken.

An der linken Hand eines Mannes sah ich 1868 den Ramus dorsalis des Nervus ulnaris an die Haut des 4. und 5. Fingers, und den R. superficialis des N. radialis an die Haut aller Finger Zweige abgeben.