

Jene Annahme konnte durch die mikroskopische Untersuchung der scheinbar grauen Substanz leicht widerlegt werden, da sich nur Nervenfasern fanden. Eine genauere Betrachtung ergab, dass es sich um Bündel der Bogenfasern handelte, welche sich von dem äusseren Umfange der Medulla abtrennten und statt um den unteren Rand der Pyramide herum quer durch dieselbe zur Raphe verliefen. Zur Erklärung dieses sonst nicht beobachteten Verlaufes dient vielleicht, dass die Gruppen von Ganglien-zellen, welche als Nuclei arciformes zusammengefasst werden, auf der linken Seite sich nicht an der gewöhnlichen Stelle befanden, sondern verhältnissmässig weit oben neben der Raphe.

5.

Tabelle über alle in Rostock im Jahre 1877 geschlachteten und auf Trichinen untersuchten Schweine.

Vom Universitäts-Mechanicus A. Petri in Rostock.

1877.	Im Schlachthaus.	Von Privaten.	Zusammen.	Trichinische Schweine.
Januar	726	207	933	
Februar	586	135	721	
März	577	47	624	
April	644	8	652	
Mai	498	6	504	
Juni	397	0	397	
Juli	390	2	392	1
August	459	1	461	
September	529	4	533	
October	687	13	700	
November	695	63	758	
December	668	219	887	1
Summa	6856	705	7562	2