

spruche: das von Hilgendorf dem Os zygomaticum bipartitum verliehene Prädicat: „Os japonicum“ ist gewesen¹⁾.

VII. (CXXV.) Musculus hyo-fascialis.

(5. Fall.)

Diesen von mir seit 1869 gekannten Muskel, von dem ich 1878 vier Fälle mittheilte²⁾, habe ich Ende Januar 1879 an der Leiche eines Mannes das 5. Mal beobachtet.

Der Musculus omohyoideus der rechten Seite war wie gewöhnlich beschaffen. An der linken Seite fehlte aber diesem Muskel der untere Bauch. Der obere Bauch war als M. hyo-fascialis zugegen. Dieser entsprang an der Stelle vom Os hyoides, wo sich der M. omohyoideus normal inserirt. Er endete an der Fascia omosterno-clavicularis hinter dem Sternocleidomastoideus vor den grossen Halsgefässen derselben Seite.

VIII. (CXXVI.) Nachträge zum Vorkommen des Musculus scapulo-costalis minor (6.—11. Fall eigener Beobachtung) und neuer Musculus scapulo-costoclavicularis.

A. Zum Musculus scapulo-costalis minor.

Mit diesem Namen habe ich einen supernumerären Muskel bezeichnet, der mit dem Subclavius und ohne denselben vorkommen

¹⁾ Weitere Funde in Ostasien werden meinen Ausspruch kaum alteriren.

Wollte ich, auf Massenuntersuchungen und Massenfunde gestützt, so verfahren, wie die ostasiatische Gesellschaft, mit Dutzenduntersucherei und mit einem Minimum von Funden, dann könnte ich, nicht nur für viele von mir entdeckte und mitunter in Massen von Fällen gefundene Varietäten, sondern auch für viele, von Anderen entdeckten, von mir aber in grösseren Summen bestätigte Varietäten, und darunter auch solche, welche in Bildungshemmung begründet sind, mit mehr Recht mit den Prädicaten: „Russicus, Russica, Russicum“ umherwerfen. Aber ich würde mich derselben Fehler schuldig machen, wie Hilgendorf und Genossen. Man nehme nur bei anderen Rassen dieselben Massenuntersuchungen vor, wie ich bei der slavischen Rasse, dann wird man dieselben Varietäten und in derselben Häufigkeit vorfinden. Warum namentlich in Bildungshemmung begründete Varietäten bei einer Rasse häufiger vorkommen sollten, als bei anderen, ist nicht einzusehen.

²⁾ Ein den oberen Bauch des Omohyoideus (bei Mangel des unteren Bauches des letzteren) repräsentirender Musculus hyo-fascialis. Anatom. Notizen No. CXVII. Dieses Archiv Bd. 74. Berlin 1878. S. 454.