

Hinter dem Introitus vaginae befindet sich eine Fossa navicularis; der Längsdurchmesser derselben beträgt circa 1 cm. Die kleinen Labien theilen sich in gehöriger Weise in zwei Falten, von denen eine das Frenulum, die andere das Präputium des kleinen Penis bildet. Die grossen Labien weichen in nichts von dem gewöhnlichen Typus ab. — Soweit der jetzige Befund; vorstehende schematische Zeichnung ist vielleicht geeignet, denselben anschaulicher zu machen. Ob Pseudohermaphroditismus masculinus oder femininus oder ob wirklicher Hermaphroditismus vorliegt, ist vor dem Eintreten der Pubertät wohl nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Ob Patientin das Eintreten der Pubertät überleben wird, ist zweifelhaft, da der allgemeine somatische Zustand derselben ein schlechter ist. Hoffentlich entgeht der Fall bei seinerzeit eintretendem lethalen Exitus nicht der Section und ermöglicht dann die Erstattung genauerer Angaben!

B e r i c h t i g u n g e n.

Seite 153 Zeile 16 v. o. muss es heißen Fig. 16 statt Fig. 15

- - - - 24 v. o. - - - - Fig. 15b statt Fig. 14a
 - 486 - 3 v. u. - - - - Bd. CVIII statt Bd. C