

zugänglich sind, ganz abgesehen davon, daß ihre Zahl so groß ist, daß der rechnerische Aufwand untragbar wäre, hat man verschiedene Verfahren entwickelt (z. B. BRILL und Mitarbb.<sup>19</sup>, RENNIGER<sup>20</sup> und VAN RAIJEN<sup>21</sup>), diese Schwierigkeiten zu umgehen. Diese Verfahren sind aber z. Tl. mit methodischen Fehlern behaftet.

Die Rosetten, die immer dann auftreten, wenn es nicht gelang, den Abbrucheffekt völlig zu unterdrücken, geben keinerlei Hinweis auf die wahre ElektronendichteVerteilung im Kristall, insbesondere ist es natürlich unmöglich, daraus Feinheiten über die Bindungszustände der Kristallbausteine herleiten zu wollen.

## 5. Rest-Fourier-Synthese

Bei der Durchführung einer Strukturbestimmung mit Hilfe der GAUSS-Approximation wird die Übereinstimmung der Näherungsstrukturamplituden  $f'(b)$  der

Gl. (46) mit den Meßwerten  $f(b_h)$  nicht exakt erfüllt sein (vgl. Abb. 3). Sind die Abweichungen größer, als die Meßfehler  $\Delta f(b_h)$  es zulassen, so müssen die Rest-FOURIER-Koeffizienten  $\delta f(b_h) = f(b_h) - f'(b_h)$  durch eine Rest-FOURIER-Synthese berücksichtigt werden

$$\delta \varrho_\infty(x) = \sum_h \delta f(b_h) e^{-2\pi i (b_h x)} \quad (54)$$

und die Korrekturen  $\delta \varrho_\infty$  der durch Invertransformation von  $f'(b) z^{1/v_r}$  erhaltenen Elektronendichte  $\varrho_\infty$  hinzugefügt werden.

Im Fall komplizierterer Strukturen wird dieser Zusatzterm  $\delta \varrho_\infty$  in vielen Fällen zweifellos nicht vernachlässigbar klein sein. Die Auswertung wird dann also aufwendiger. Trotzdem bietet sie gegenüber der Total-FOURIER-Synthese Gl. (27) den großen Vorteil stark reduzierten Rechenaufwandes, da ja wesentliche Teile der Funktion  $f(b)$  bereits durch Faltungstransformation verarbeitet wurden, die Nachteile der FOURIER-Synthese also nur die Restterme betreffen.

<sup>19</sup> R. BRILL, H. C. GRIMM, C. HERMANN u. CL. PETERS, Ann. Phys., Lpz. **34**, 393 [1939].

<sup>20</sup> M. RENNIGER, Acta Cryst. **5**, 711 [1952].

<sup>21</sup> L. v. RAIJEN, Selected Topics in X-Ray Crystallography, Editor J. Bouman, Amsterdam.

## NOTIZEN

### Zum Zerfall der Palladium-Isomere $Pd^{105m}$ und $Pd^{109m}$

Von TH. STRIBEL \*

Hochspannungslaboratorium Hechingen und Institut für Kernphysik der Universität Frankfurt (Main)  
(Z. Naturforschg. **12 a**, 939—940 [1957]; eingegangen am 10. Oktober 1957)

Die von FLAMMERSFELD<sup>1</sup> beschriebenen und den Massenzahlen 105 und 109 zugeordneten beiden Palladium-Isomere von 23 sec und 4,8 min Halbwertszeit wurden mittels schneller Li(d, n)-Neutronen über einen (n, 2n)-Prozeß an Palladium-Metall erzeugt und mit einem Szintillations- $\gamma$ -Spektrometer neu untersucht. Die  $\gamma$ -Energien wurden mit Hilfe eines 100-Kanal-Analysators vermessen und aus dem Intensitätsverhältnis der RÖNTGEN-K-Linie zur  $\gamma$ -Linie unter Berücksichtigung von Korrekturen für die Empfindlichkeit des NaI-Kristalls, Absorption im Präparat und in der Kristallfassung sowie für die K-Schalen-Fluoreszenzausbeute<sup>2</sup> die K-Konver-

sionskoeffizienten  $\alpha_K$  bestimmt. Da sich die beiden  $\gamma$ -Peaks stark überdecken, wurde von dem sofort nach der Bestrahlung aufgenommenen Spektrum das nach dem Abfallen der 21-sec-Aktivität erhaltene des reinen 4,8-min-Isomers abgezogen und so die beiden Anteile getrennt erhalten. Weiter haben wir die Halbwertszeiten der  $\gamma$ -Aktivitäten sowie das Verhältnis ihrer Anfangsintensitäten bei definierter Bestrahlungszeit genauer ermittelt:

$Pd^{105m}$ :  $T = 21,3 \pm 0,5$  sec

Die gemessene  $\gamma$ -Energie von  $216 \pm 5$  keV stimmt mit der von FLAMMERSFELD<sup>1</sup> für die Konversionselektronen gemessenen Energie von etwa 200 keV gut überein. Für  $\alpha_K$  erhalten wir den Wert von  $0,30 \pm 0,05$ .

$Pd^{109m}$ :  $T = 4,75 \pm 0,05$  min

Wir messen für die  $\gamma$ -Energie einen Wert von  $188 \pm 5$  keV, der damit etwa 15 keV höher liegt als der von KAHN<sup>3</sup> ebenfalls mit dem Szintillations-Spektrometer gemessene.  $\alpha_K$  ergibt sich zu  $0,60 \pm 0,1$ .

\* Jetzt Battelle-Institut, Frankfurt/Main, Wiesbadener Str.  
1 A. FLAMMERSFELD, Z. Naturforschg. **7 a**, 296 [1952].  
2 I. BERGSTRÖM in: K. SIEGBAHN, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy, Amsterdam 1955, S. 630.

<sup>3</sup> J. H. KAHN, Oak Ridge National Laboratory Unclassified Report ORNL-1089 (Nov. 1951).



Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht: Creative Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Zum 01.01.2015 ist eine Anpassung der Lizenzbedingungen (Entfall der Creative Commons Lizenzbedingung „Keine Bearbeitung“) beabsichtigt, um eine Nachnutzung auch im Rahmen zukünftiger wissenschaftlicher Nutzungsformen zu ermöglichen.

This work has been digitized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the Advancement of Science under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Germany License.

On 01.01.2015 it is planned to change the License Conditions (the removal of the Creative Commons License condition "no derivative works"). This is to allow reuse in the area of future scientific usage.

Aus dem Verhältnis der auf Sättigung umgerechneten Anfangsaktivitäten erhalten wir, unter Berücksichtigung der Kristallempfindlichkeit sowie des Konversionskoeffizienten, für die Erzeugung von  $Pd^{109m}$  einen etwa 1,5-mal größeren Querschnitt als für  $Pd^{105m}$ , bezogen auf die Häufigkeit der Ausgangsisotope  $Pd^{110}$  und  $Pd^{106}$ . Dies ist aus der Lage der beiden Isotope zur  $\beta$ -Stabilitätslinie leicht verständlich. Die zur Berechnung verwendeten  $\alpha$ -Werte wurden aus den gemessenen  $\alpha_K$  durch Addition der aus den Tafeln von ROSE<sup>5</sup> entnommenen Werte für  $\alpha_L$  erhalten.

#### Zur Klassifikation der Isomere:

Die Eintragung der reduzierten Lebensdauer

$$\tau_\gamma \cdot A^{2J+3} \cdot E_\gamma^{2J+1}$$

[mit  $\tau_\gamma = T(1+\alpha)/\ln 2$ ] ins GOLDHABER-SUNYAR-Dia-

gramm<sup>4</sup> deutet, worauf schon FLAMMERSFELD hingewiesen hat, auf E 3-Übergänge bei beiden Isomeren. Die gemessenen  $\alpha_K$  sind damit nach den von ROSE<sup>5</sup> berechneten Tafeln der Konversionskoeffizienten in bester Übereinstimmung. Ebenfalls noch, aber wesentlich schlechter, verträglich wären damit magnetische Quadrupol-Übergänge, die jedoch auf Grund der  $\gamma$ -Lebensdauer sicher auszuschließen sind. Wenn man für beide Isomere den nach dem Schalenmodell<sup>6, 7</sup> zu erwarten- den Grundzustand  $d_{5/2}$  annimmt, der für  $Pd^{105}$  auch gemessen ist<sup>8</sup>, so läßt der Übergang  $\Delta I=3$  mit Paritätsänderung für den angeregten Zustand die Zuordnung  $h_{11/2}$  vermuten.

Diese Untersuchung wurde zum Teil durch Leihgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht.

<sup>4</sup> M. GOLDHABER, A. W. SUNYAR in: K. SIEGBAHL<sup>2</sup>, S. 453.

<sup>5</sup> M. E. ROSE in: K. SIEGBAHL<sup>2</sup>, S. 905.

<sup>6</sup> J. H. D. JENSEN in: K. SIEGBAHL<sup>2</sup>, S. 414.

<sup>7</sup> M. GOEPPERT-MAYER in: K. SIEGBAHL<sup>2</sup>, S. 433.

<sup>8</sup> P. BRIX u. A. STEUDEL, Naturwiss. **38**, 431 [1951].

## Prinzip eines Linsenspektrometers mit Enveloppenblenden

Von H. DANIEL

Institut für Physik im Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, Heidelberg  
(Z. Naturforsch. **12a**, 940—941 [1957]; eingegangen am 18. Oktober 1957)

Im folgenden soll angedeutet werden, wie man bei einem magnetischen  $\beta$ -Spektrometer mit zwei Linsen trotz sphärischer Aberration in jeder Einzellinse im Idealfall die Auflösebreite Null erreichen kann, ohne daß gleichzeitig die Lichtstärke verschwindet.

Das Prinzip des Gerätes läßt sich etwa wie folgt charakterisieren: Die Elektronen aus einer Punktquelle auf der Achse gelangen zuerst in eine stark ablenkende Linse geringer sphärischer Aberration und danach in eine schwach ablenkende Linse starker sphärischer Aberration. Zwischen beiden Linsen befindet sich eine Blende in Form der Enveloppe des Bündels, die alle Elektronen zu großen Impulses<sup>1</sup> abschneidet, so daß nur noch Elektronen mit richtigem und zu kleinem Impuls in die zweite Linse eintreten. Elektronen zu kleinen Impulses geraten hier wegen der starken sphärischen Aberration dieser Linse in ein Gebiet so kleiner Brechkraft, daß sie mit einer zweiten enveloppenförmigen Blende hinter der zweiten Linse, die das Bündel ebenfalls von außen umhüllt, abgeschnitten werden. Elektronen richtigen Impulses  $p_0$  passieren beide Blenden und treten in den Zähler auf der Achse ein. Beide Blenden sind konvex gegen die Achse.

Abb. 1 gibt den Strahlengang schematisch wieder. Dort findet man auch die im Text nicht erläuterten Be-

zeichnungen. Wegen der Rotationssymmetrie des Problems kann man von der in Wirklichkeit auftretenden Schraubung der Elektronenbahnen um die Achse abssehen.

Man darf nicht erhoffen, die Geometrie- und Lit. Daten mit der für die Praxis erforderlichen Genauigkeit geschlossen ausrechnen zu können. Es soll deshalb nur an einem speziellen Fall gezeigt werden, daß sich die Forderungen an die Linsen nicht widersprechen. Dazu werden dünne Linsen und angenähert achsenparalleler Strahlengang zwischen den Linsen vorausgesetzt. Die Ablenkung in den Linsen werde durch die quadratische Näherung<sup>2</sup>

$$\vartheta_1 = \frac{p_0^2}{p^2} (\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2),$$

$$\vartheta_2 = \frac{p_0^2}{p^2} (\gamma_0 + \gamma_1 y + \gamma_2 y^2)$$

wiedergegeben;  $\beta_0$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_0$ ,  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  sind Konstanten,  $p$  ist der Elektronenimpuls. Die Rechnung beschränkt sich auf Glieder höchstens zweiter Ordnung in  $x$  und  $y$ .

Man findet als Bedingung für die Lage von

Blende 1:  $b - d > 0$  und

Blende 2:  $\frac{b - d}{\gamma_1(b - d) - 1} > 0,$

als Bedingung für das Abschneiden kleinerer Impulse durch Blende 2:

$$\frac{\beta_0}{1 - b/d} + \gamma_0 < 0 \quad (I)$$

und als Bedingung für die Konvexität von Blende 2:

<sup>1</sup> P. HUBERT, C. R. Acad. Sci., Paris **230**, 1464 [1950]. — J. F. PERKINS u. A. W. SOLBRIG JR., Phys. Rev. **79**, 415 [1950].

<sup>2</sup> Dieses Verfahren ist von BOTHE angewandt worden; W. BOTHE, Naturwiss. **37**, 41 [1950]; S. B. Heidelberg, Akad. Wiss. (Math.-Naturwiss. Kl.) 191 [1950].